

Audit cholestérol : synthèse des résultats de l'exploitation des 2 tours

1. Recrutement, participation

- ✓ 186 médecins ont répondu à l'audit au premier tour et 68 au second (la comparaison des résultats entre les 2 tours concerne ces 68 médecins qui ont réalisé les 2 tours)
- ✓ 37 % des médecins ayant participé au premier tour, ont fait le second.
- ✓ Nombre de patients inclus au 1^{er} tour : 3560 (dont 1284 par les 68 médecins ayant également fait le 2^{ème} tour)
- ✓ Nombre de patients inclus au 2^{ème} tour : 1344
- ✓ Répartition des patients selon les facteurs de risque :
 - 1/3 des patients sont à haut risque vasculaire pour les 2 tours
 - patients à bas risque (seuil LDL 2.20 g/l) : 7% au 1^{er} tour, 4 % au 2^{ème}

2. Résultats : diététique

✓ **Résultats par patient :**

L'objectif retenu pour admettre qu'un patient connaisse la diététique est qu'il réponde juste à 8 ou 9 photographies.

- 1^{er} tour : 35 % des patients répondent à ce critère
- 2^{ème} tour : 42 % pour T2. On assiste donc à une amélioration de cet objectif entre les 2 tours. (augmentation de 20 % du critère)

✓ **Résultats par médecin :**

L'objectif retenu est que 75 % des patients, traités par un médicament hypocholestérolémiant, de chaque médecin, doivent répondre de manière correcte à 8 ou 9 photographies.

La proportion de médecin ayant répondu à ce critère est passée de 1.5 à 4.4 % entre les 2 tours. (résultat multiplié par presque 3)

3. Résultats : patients traités à tort

✓ **Résultats par patient : étude globale**

- 1^{er} tour : 20%
- 2^{ème} tour : 11 %

✓ **Résultats par patient : étude par sous groupes**

- Patients à bas risque (seuil 2.20g/l) :
 - 1^{er} tour : 85%
 - 2^{ème} tour : 58%
- Patients à risque moyen (seuil 1.90g/l)
 - 1^{er} tour : 46%
 - 2^{ème} tour : 33%

4. Résultats : patients insuffisamment traités

✓ **Résultats par patient : étude globale**

- 1^{er} tour : 20%
- 2^{ème} tour : 15 %

- ✓ **Résultats par patient : étude en sous groupe**
 - **Patients à haut risque vasculaire (seuil 1g/l)**
 - 1^{er} tour : 59%
 - 2^{ème} tour : 42 %

5. Résultats : atteinte de l'objectif thérapeutique (dernier LDL < seuil d'intervention)

✓ **Résultats par médecin**

L'objectif retenu est que 80 % des patients, traités par un médicament hypocholestérolémiant, d'un médecin, doivent avoir un dosage de moins d'un an, et que celui-ci soit inférieur au seuil d'intervention.

41 % des médecins ont atteint l'objectif au second tour contre 28 % au premier. (+ 32 %)

