



Audit dépistage de l'hépatite C chez les patients à risque

critères d'inclusion :

- . Patient suivi par vous : au moins 3 consultations au cours des 2 dernières années
- . Patient à risque
- . Patient vu en consultation

Qui inclure : les 15 premiers patients au cours d'une période de trois mois maximum

Comment inclure : au fur et à mesure des consultations. Ne pas tenir compte d'une sérologie prescrite le jour de la consultation d'inclusion.

Question : Trouve t-on dans le dossier du patient un résultat de sérologie de l'hépatite C ?



Code médecin | Code médecin | date de début du recueil :
 .../.../... | .../.../... |

Partie à conserver | **Partie à adresser au responsable :**
FISCHER Judith, 12 Place St Epvre 54000 NANCY

N°	Nom et prénom	Sérologie (présence dans dossier)		Si sérologie : résultat		Situation à risque		Commentaires (Situations à risque rencontrées, suites données au dépistage si résultat +, difficulté du dépistage)
		0	N	POSITIF	NEGATIF	ELEVE	FAIBLE	
	Ex : Dupont J	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		Patient toxicomane pris en charge et traité
	Ex : Durand M		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	J'ignorais que cette patiente avait été transfusée en 1990
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								



Situations à risque de contamination par le VHC :

SITUATION A RISQUE ELEVE(Prévalence > 2%)

Antécédents de transfusion sanguine avant 1992 quelque soit le produit dérivé du sang

Par extension, sujets ayant subi avant 1992 :
 -intervention chirurgicale lourde
 -séjour en réanimation
 -accouchement difficile
 -soins en néonatalogie ou enfant né avec une pathologie grave

Toxicomanie ancienne ou actuelle par voie intraveineuse ou par voie nasale.
 (chez les toxicomanes actifs le dépistage doit être répété régulièrement)

Enfants nés de mères VHC +

Patients VIH +

Patients hémodialysés

SITUATION A RISQUE PLUS FAIBLE (Prévalence < 2%)

Entourage de sujets VHC + :
 -partenaires sexuels
 et /ou -partage d'objets souillés par le sang (brosse à dent, rasoir, ...)

Antécédent d'incarcération

Sujets ayant eu sans l'utilisation de matériel à usage unique :
 -tatouage, piercing
 -acupuncture, mésothérapie

Sujets ayant un taux d'ALAT élevé (supérieur à la norme définie) inexpliqué

Sujets originaires ou ayant reçu des soins médicaux de pays présumés à forte Prévalence de VHC (Asie du sud-est, Amérique du sud, Afrique, Moyen-orient