



**Audit : « Diabète de type 2 : prise en charge des facteurs de risque vasculaire et objectifs thérapeutiques. » Résultats du 1<sup>er</sup> Tour**

Votre n°Anonymat :

	Ensemble des participants (valeurs extrêmes)	Vos résultats
Nombre moyen de patients inclus par médecin	17(5à 20)	
Pourcentage de patients à haut risque cardiovasculaire	61%(11%-100%)	
Proportion des différentes modalités de traitement antidiabétiques	Régime seul : 2%(0%-50%) Monothérapie : 47%(17%-85%) Bithérapie : 41%(13%-63%) Trithérapie : 10% (0%-35%)	
Proportion de patients équilibrés du point de vue tensionnel	48%(0%-90%)	
Valeur moyenne des dernières mesures de TA (mmHg)	134/75(110/60-196/87)	
Proportion de patients équilibrés du point de vue de l'HbA1C	56%(10%-100%)	
Proportion de patient ayant eu un dosage d'HbA1C dans les 4 mois	84%(25-100%)	
Délai moyen depuis le dernier dosage de l'HbA1C (mois)	3 mois (0-20)	
Proportion de patients à haut risque vasculaire équilibrés du point de vue du LDL-cholestérol	51%(0%-100%)	
Valeur moyenne du LDL chez les patients à haut risque vasculaire (g/l)	1,03 g/l (0,28-2,23)	
Proportion de patients ayant eu un dosage du LDL -cholestérol dans l'année	91%(58%-100%)	
Délai moyen depuis le dernier dosage de LDL (mois)	6,5 mois (0-72)	
Proportion de patients à haut risque vasculaire traités par aspirine ou alternative.	73%(33-100%)	