


# Audit :Prise en charge des patients sous traitements substitutifs aux opiacés

Résultats du 1<sup>er</sup> tour  
Novembre 2010

Audrey LE MAUX, avril 2011

- 
- Nombre de participants : 20
  - Nombre de patients inclus : 92
- Soit en moyenne 4.6 patients inclus par médecins

# Mention de consommation d'opiacés avant le traitement

- Objectif : 100%
- Réponses positives : 85 sur 92 soit 92.4%
- Réponses négatives : 7 sur 92 soit 7.6%

# Mention de recherche de coaddictions

- Objectif : 80%
- Réponses positives : 86 sur 92 soit 93.5%
- Réponses négatives : 6 sur 92 soit 6.5%

# Mentions de recherches d'injections avant le traitement

- Objectif : 100%
- Réponses positives : 62 sur 92 soit 67.4%
- Réponses négatives : 30 sur 92 soit 32.6%

# Mention de persistance de consommation d'opiacés pendant le traitement

- Objectif : 90 %
- Réponses positives : 75 sur 92 soit 81.5%
- Réponses négatives : 17 sur 92 soit 18.5%

# Résultat de sérologie VHC

- Objectif : 90%
- Réponses positives : 58 sur 92 soit 63%
- Réponses négatives : 34 sur 92 soit 37%

# Nom de la pharmacie

- Objectif : 100%
- Réponses positives : 86 sur 92 soit 93.5%
- Réponses négatives : 6 sur 92 soit 6.5%



# Posologie de la dernière prescription

- Objectif : 100%
- Réponses positives : 90 sur 92 soit 97.8%
- Réponses négatives : 2 sur 92 soit 2.2%

# Durée de la dernière prescription

- Objectif : 100%
- Réponses positives : 88 sur 92 soit 95.6%
- Réponses négatives : 4 sur 92 soit 4.4%

# Rythme de délivrance de la dernière prescription

- Objectif : 100 %
- Réponses positives : 87 sur 92 soit 94.6%
- Réponses négatives : 5 sur 92 soit 5.4%